

マントル細胞リンパ腫

※患者さんの状況に合わせて、投与量や投与間隔等が変更になることがあります。

レジメン	薬剤名	投与量・投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Bendamustine	ベンダムスチン	120 mg/m2 1hr div	↓	↓							・3週毎に施行 ・血管痛発現予防のため、刺入部を温めながら投与する。													
R-B (2days)	リツキシマブ	375 mg/m2 div	↓								・4週毎に施行（3日間に分けて行うこともある。） ・リツキシマブは前投与薬（抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤）が必要													
	ベンダムスチン	90 mg/m2 1hr div	↓	↓							・ベンダムスチン投与時、血管痛発現予防のため、刺入部を温めながら投与する。													
VR-CAP(R day1)	ベルケイド	1.3mg/m2 s.c.	↓			↓				↓			↓											・3週毎に施行 （リツキシマブはday2に行うこともある） ・リツキシマブは前投与薬（抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤）が必要
	ドキソルビシン	50mg/m2 急速点滴	↓																					
	エンドキサン	750mg/m2 1hr div	↓																					
	リツキシマブ	375 mg/m2 div	↓																					
	プレドニン	100mg/body po or div	↓	↓	↓	↓	↓																	