

ホジキンリンパ腫

※患者さんの状況に合わせて、投与量や投与間隔等が変更になることがあります。

レジメン	薬剤名	投与量・投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
A+AVD	ドキソルビシン	25mg/m2 急速点滴	↓														↓															・4週毎に施行 6コース ・ダカルバジンは血管痛予防のため点滴、ルートも遮光
	エクザール	6mg/m2 急速点滴	↓														↓															
	ダカルバジン	375mg/m2 30min div	↓														↓															
	アドセトリス	1.2mg/kg 30min div	↓														↓															
Nivolumab	オプジーボ	240mg/body 30min div	↓														↓															・古典的ホジキンリンパ腫 ・2週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する
4weekly Nivolumb	オプジーボ	480mg/body 30min div	↓																													・古典的ホジキンリンパ腫 ・4週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する
Pembrolizumab	キイトルーダ	200mg/body 30min div	↓																					↓								・古典的ホジキンリンパ腫 ・3週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する
6weekly Pembrolizumab	キイトルーダ	400mg/body 30min div	↓																													・古典的ホジキンリンパ腫 ・6週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する