

乳癌

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考
AC	ドキソリビン	60 mg/m ²	急速点滴	↓																										<ul style="list-style-type: none"> ・3週毎に施行(dd-ACの場合は2週間毎) ・血管痛・静脈炎予防のためドキソリビン投与直後に100mLの生食でフラッシュする。 		
	エンドキサン	600 mg/m ²	1時間	↓																												
EC	エピルビン	90 mg/m ²	急速点滴	↓																									<ul style="list-style-type: none"> ・3週毎に施行(dd-ECの場合は2週間毎) ・血管痛・静脈炎予防のためエピルビン投与直後に100mLの生食でフラッシュする。 			
	エンドキサン	600 mg/m ²	1時間	↓																												
dd-PTX	パクリタキセル	175 mg/m ²	3時間	↓														↓										<ul style="list-style-type: none"> ・2週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する ・パクリタキセルは前投与薬(テキサート、ネオレスター、ファモチジン)が必要 				
TC	ドセタキセル	75 mg/m ²	1時間	↓																									<ul style="list-style-type: none"> ・3週毎に施行 			
	エンドキサン	600 mg/m ²	1時間	↓																												
Avastin/ PTX	アバスチン	10 mg/kg 初回:90分 2回目:60分 以後 30分		↓														↓										<ul style="list-style-type: none"> ・4週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する ・パクリタキセルは前投与薬(テキサート、ネオレスター、ファモチジン)が必要 				
	パクリタキセル	90 mg/m ²	1時間	↓						↓								↓														
Eribulin	ハラウエン	1.4 mg/m ²	急速点滴	↓						↓																	<ul style="list-style-type: none"> ・3週毎に施行 ・無水エタノール含有(0.1mL/V) 					
Kadcyla	カトサイラ	3.6 mg/kg 初回:90分 以後 30分		↓																								<ul style="list-style-type: none"> ・HER2陽性 ・3週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する 				
Enhertu	エンハーツ	5.4 mg/kg 初回:90分 以後 30分		↓														↓										<ul style="list-style-type: none"> ・HER2陽性 ・3週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する 				

乳癌

* Trastuzumab併用レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考
Trastuzumab	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																										・3週毎に施行		
		6 mg/kg																														
Trastuzumab/ weeklyPTX	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																										・3週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する。 ・パクリタキセルは前投与薬(テキサート、ネオレスター、ファモチジン)が必要		
		6 mg/kg																														
	パクリタキセル	80 mg/m ²	1時間	↓							↓																					
Trastuzumab/ DTX75	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																										・3週毎に施行		
		6 mg/kg																														
	ドセタキセル	75 mg/m ²	1時間	↓																												
Trastuzumab/ DTX60	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																										・3週毎に施行		
		6 mg/kg																														
	ドセタキセル	60 mg/m ²	1時間	↓																												
Trastuzumab/ VNR	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																									・3週毎に施行 ・血管痛・静脈炎予防のため末梢投与時はロゼウス投与直後に250mLの補液を投与する。			
		6 mg/kg																														
	ロゼウス	25 mg/m ²	急速点滴	↓							↓																					
Trastuzumab/ Eribulin	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																									・3週毎に施行 ・無水エタノール含有(0.1mL/V)			
		6 mg/kg																														
	ハラヴエン	1.4 mg/m ²	急速点滴	↓							↓																					
weekly Trastuzumab	トラスツズマブ	4 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																									・毎週施行			
		2 mg/kg									↓								↓													
weekly Trastuzumab/ weeklyPTX	トラスツズマブ	4 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																									・毎週施行、計12週 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する。 ・パクリタキセルは前投与薬(テキサート、ネオレスター、ファモチジン)が必要			
		2 mg/kg									↓								↓													
	パクリタキセル	80 mg/m ²	1時間	↓							↓								↓													

* Pertuzumab+Trastuzumab併用レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考
Pertuzumab/ Trastuzumab	パージェタ	840 mg	1時間	↓																										・3週毎に施行		
		420 mg	30分間																													
	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																												
		6 mg/kg																														
Pertuzumab/ Trastuzumab/ weeklyPTX	パージェタ	840 mg	1時間	↓																									・3週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する。 ・パクリタキセルは前投与薬(デキサート、オレスター、ファモチジン)が必要			
		420 mg	30分間																													
	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																												
		6 mg/kg																														
	パクリタキセル	80 mg/m ²	1時間	↓																												
Pertuzumab/ Trastuzumab/ DTX75	パージェタ	840 mg	1時間	↓																									・3週毎に施行			
		420 mg	30分間																													
	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																												
		6 mg/kg																														
	ドセタキセル	75 mg/m ²	1時間	↓																												
Pertuzumab/ Trastuzumab/ DTX60	パージェタ	840 mg	1時間	↓																									・3週毎に施行			
		420 mg	30分間																													
	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																												
		6 mg/kg																														
	ドセタキセル	60 mg/m ²	1時間	↓																												
Pertuzumab/ Trastuzumab/ Eribulin	パージェタ	840 mg	1時間	↓																								・3週毎に施行 ・無水エタノール含有(0.1mL/V)				
		420 mg	30分間																													
	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																												
		6 mg/kg																														
	ハラヴエン	1.4 mg/m ²	急速点滴	↓																												
Pertuzumab/ Trastuzumab/ DTX/ CBDCA	パージェタ	840 mg	1時間	↓																								・3週毎に施行 ・無水エタノール含有(0.1mL/V)				
		420 mg	30分間																													
	トラスツズマブ	8 mg/kg	1,2回目:90分 以後30分	↓																												
		6 mg/kg																														
	ドセタキセル	75 mg/m ²	1時間	↓																												
	カルボプラチン	AUC:6	1時間	↓																												

* フェスゴ併用レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考
フェスゴ	フェスゴ	初回	IN	皮下注 8分	↓																									・3週毎に施行		
		2回目以降	MA	皮下注 5分																												
フェスゴ/ weeklyPTX	フェスゴ	初回	IN	皮下注 8分	↓																								・3週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する。 ・パクリタキセルは前投与薬(デキサート、ネオレスター、ファモチジン)が必要			
		2回目以降	MA	皮下注 5分																												
	パクリタキセル	80 mg/m ²	1時間	↓							↓																					
フェスゴ/ DTX75	フェスゴ	初回	IN	皮下注 8分	↓																								・3週毎に施行			
		2回目以降	MA	皮下注 5分																												
	ドセタキセル	75 mg/m ²	1時間	↓																												
フェスゴ/ DTX60	フェスゴ	初回	IN	皮下注 8分	↓																								・3週毎に施行			
		2回目以降	MA	皮下注 5分																												
	ドセタキセル	60 mg/m ²	1時間	↓																												
フェスゴ/ Eribulin	フェスゴ	初回	IN	皮下注 8分	↓																								・3週毎に施行 ・無水エタノール含有(0.1mL/V)			
		2回目以降	MA	皮下注 5分																												
	ハラヴエン	1.4 mg/m ²	急速点滴	↓							↓																					

* Pembrolizumab併用レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考
Pembrolizumab+ GEM/CBDCA	キイトルーダ	200 mg/body	30分間	↓																										・PDL1陽性トリプルネガティブ乳癌 ・3週毎に施行		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30分間	↓							↓																					
	カルボプラチナ	AUC:2	1時間	↓							↓																					
Pembrolizumab+ PTX/CBDCA	キイトルーダ	200 mg/body	30分間	↓																									・トリプルネガティブ乳癌 術前治療①1-4サイクル目 ・3週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する。 ・パクリタキセルは前投与薬(デキサート、ネオレスター、ファモチジン)が必要			
	パクリタキセル	80 mg/m ²	1時間	↓							↓							↓														
	カルボプラチナ	AUC:5	1時間	↓																												
Pembrolizumab+ AC	キイトルーダ	200 mg/body	30分間	↓																									・トリプルネガティブ乳癌 術前治療②5-8サイクル目 ・3週毎に施行			
	ドキソルビシン	60 mg/m ²	急速点滴	↓																												
	エンドキサン	600 mg/m ²	1時間	↓																												
Pembrolizumab+ EC	キイトルーダ	200 mg/body	30分間	↓																									・トリプルネガティブ乳癌 術前治療②5-8サイクル目 ・3週毎に施行			
	エピルビシン	90 mg/m ²	急速点滴	↓																												
	エンドキサン	600 mg/m ²	1時間	↓																												
Pembrolizumab	キイトルーダ	200 mg/body	30分間	↓																									・トリプルネガティブ乳癌 術後治療 ・3週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する			