

泌尿器癌

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考			
GC	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30分間	↓							↓							↓														・膀胱癌 ・4週毎に施行 ・GEMの血管痛に注意。 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要			
	シスプラチン	70 mg/m ²	2時間		↓																														
3weeklyGC	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30分間	↓							↓														↓									・膀胱癌 ・3週毎に施行 ・GEMの血管痛に注意。 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要	
	シスプラチン	70 mg/m ²	2時間		↓																					↓									
GEM/ CBDCA	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30分間	↓																					↓									・膀胱癌 ・3週毎に施行 ・GEMの血管痛に注意。	
	カルボプラチン	AUC:5	1時間	↓																					↓										
Pembrolizumab	キイトルーダ [®]	200 mg/body	30分間	↓																					↓									・尿路上皮癌、腎細胞癌 ・3週毎に施行 ・フィルター付きの点滴セットを使用する	
6weekly Pembrolizumab	キイトルーダ [®]	400 mg/body	30分間	↓																														・尿路上皮癌、腎細胞癌 ・6週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する	
GT	パクリタキセル	200 mg/m ²	3時間	↓																					↓									・尿路上皮癌3週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する ・パクリタキセルは前投与薬(デキサート、ネオレスタール、ファモチジン)が必要 ・ゲムシタビンの血管痛に注意。	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30分間	↓							↓														↓										
Cabazitaxel	ジェブタナ	25 mg/m ²	1時間	↓																					↓										・前立腺癌 ・3週毎に施行
	プレドニン	5mg×2回/日	連日投与	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	・ジェブタナ投与30分前までにクロロトリムン、デキサート、ファモチジンを投与する。
Nivolumab/ Ipilimumab	オプジーボ [®]	240 mg/body	30分間	↓																				↓										・腎細胞癌 ・3週毎に4回施行、終了後はNivolumab単剤療法へ	
	ヤーホイ	1 mg/kg	30分間	↓																				↓											・フィルター付きの点滴セットを使用する
Nivolumab	オプジーボ [®]	240 mg/body	30分間	↓														↓																・腎細胞癌 ・2週毎に施行 ・フィルター付きの点滴セットを使用する	
4weekly Nivolumab	オプジーボ [®]	480 mg/body	30分間	↓																															・腎細胞癌 ・4週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する
	ブレオ	30 mg/body	30分間		↓							↓							↓							↓									・精巣腫瘍 胚細胞腫瘍

泌尿器癌

