

ホジキンリンパ腫

※患者さんの状況に合わせて、投与量や投与間隔等が変更になることがあります。

| レジメン | 薬剤名 | 投与量・投与方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------------|--------------------------|
| A+AVD | ドキシソルビシン | 25mg/m ² 急速点滴 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | ・4週毎に施行 ・ダカルバジン 遮光 |
| | エクザール | 6mg/m ² 急速点滴 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダカルバジン | 375mg/m ² 30min div | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アドセトリス | 1.2mg/kg 30min div | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivolumab | オプジーホ | 240mg/body 30min div | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ・古典的ホジキ ・2週毎に施行 ・フィルター付き点滴 | |
| 4weekly Nivolumb | オプジーホ | 480mg/body 30min div | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・古典的ホジキ ・4週毎に施行 ・フィルター付き点滴 | |
| Pembrolizumab | キイトルーダ | 200mg/body 30min div | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・古典的ホジキ ・3週毎に施行 ・フィルター付き点滴 | |
| 6weekly Pembrolizumab | キイトルーダ | 400mg/body 30min div | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・古典的ホジキ ・6週毎に施行 ・フィルター付き点滴 | |



6コース
は血管痛予防のため点滴、ルートも

ンリンパ腫

セットを使用する

ンリンパ腫

セットを使用する

ンリンパ腫

セットを使用する

ンリンパ腫

セットを使用する
