

胃癌

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考	
S-1/CDDP (triweekly)	エスワンタイホウ	80 mg/m ²	内服 (朝夕食後 分2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	・3週毎に施行 ・S-1投与量:体表面積1.5以上は120mg/日 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要	
	シスプラチン	60 mg/m ²	2時間	↓																					↓								
G-SOX	オキサリプラチン	100 mg/m ²	2時間	↓																					↓							・3週毎に施行 ・末梢投与時はオキサリプラチンにデキサト1.65mg混注 ・S-1投与量:体表面積1.5以上は120mg/日	
	エスワンタイホウ	80 mg/m ²	内服 (朝夕食後 分2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								↓	↓	↓	↓	↓	↓		
CAPOX	オキサリプラチン	130 mg/m ²	2時間	↓																					↓							・3週毎に施行 ・オキサリプラチンの溶解液は5%糖液 ・末梢投与時はオキサリプラチンにデキサト1.65mg混注	
	カペシタビン	2000 mg/m ²	内服 (朝夕食後 分2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								↓	↓	↓	↓	↓	↓		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	↓																												・2週毎に施行 ・オキサリプラチン、レボホリナートの溶解液は5%糖液	
	レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	↓																													
	フルオウラシル	400 mg/m ²	急速点滴	↓																													
	フルオウラシル	2400 mg/m ²	46時間	↓																													
RAM/ weeklyPTX	サイラムザ	8 mg/kg	1時間	↓																												・進行・再発胃癌,2次治療以降 ・4週毎に施行	
	ハクリタキセル	80 mg/m ²	1時間	↓							↓																					・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する ・前投与薬(デキサト、クロールトリムン、ネオレスタール)が必要	
RAM単独	サイラムザ	8 mg/kg	1時間	↓																												・進行・再発胃癌,2次治療以降 ・2週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する ・前投与薬(ネオレスタール)が必要	
RAM/ weekly nabPTX	サイラムザ	8 mg/kg	1時間	↓																												・進行・再発胃癌,2次治療以降 ・4週毎に施行 ・前投与薬(ネオレスタール、ファミジン)は不要 ・特定生物由来製品:患者への説明(同意書)が必要 ・サイラムザはフィルター付き、アブラキサンはフィルターなしの点滴セットを使用する。	
	アブラキサシ	100 mg/m ²	30分間	↓							↓																						
Nivolumab	オブジーホ	240 mg/body	30分間	↓																												・2週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する	
4weekly Nivolumab	オブジーホ	480 mg/body	30分間	↓																												・4週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する	
Nivolumab/ G-SOX	オブジーホ	360 mg/body	30分間	↓																						↓						・3週毎に施行 ・末梢投与時はオキサリプラチンにデキサト1.65mg混注 ・S-1投与量:体表面積1.5以上は120mg/日 ・オブジーホはフィルター付き点滴セットを使用する	
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	2時間	↓																						↓							
	エスワンタイホウ	80 mg/m ²	内服 (朝夕食後 分2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								↓	↓	↓	↓	↓	↓		
Nivolumab/ mFOLFOX6	オブジーホ	240 mg/body	30分間	↓																												・2週毎に施行 ・オキサリプラチン、レボホリナートの溶解液は5%糖液 ・オブジーホはフィルター付き点滴セットを使用する	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	↓																													
	レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	↓																													
	フルオウラシル	400 mg/m ²	急速点滴	↓																													

	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	↓																			
S-1/DTX	ドセタキセル	40 mg/m ²	1時間	↓																			<ul style="list-style-type: none"> ・3週毎に施行 ・S-1投与量 体表面積1.5以上は120mg/日
	エスワンタイホウ	80 mg/m ²	内服 (朝夕食後 分2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
MTX/5-FU	メソトレキセート	100 mg/m ²	1時間	↓																			<ul style="list-style-type: none"> ・毎週施行可 ・メソトレキセート先行投与 ・ロイコホリンの投与方法適宜変更可 ・腎障害予防のため、メソトレキセート投与日はラシックス、NSAIDの投与を避ける。
	フルオロウラシル	600 mg/m ²	急速点滴	↓																			
	ロイコホリン	15mg/回をMTX投与終了24時間後より、6時間毎に6回、内服または静注			↓																		
Enhertu	エンハーツ	6.4 mg/kg	初回:90分 以後 30分	↓																			<ul style="list-style-type: none"> ・HER2陽性 ・3週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する

* Herceptin併用レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考
Herceptin	ハーセプチン	8 mg/kg	初回:90分	↓																												・Her2陽性進行・再発胃癌 ・3週毎に施行 ・必ず化学療法と併用すること
		6 mg/kg	2回目:90分 以後30分																						↓							
Herceptin/ S-1/CDDP	ハーセプチン	8 mg/kg	90分間	↓																											・Her2陽性進行・再発胃癌 ・3週毎に施行 ・S-1投与量 体表面積1.5以上は120mg/日 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要	
		6 mg/kg	2回目:90分 以後30分																						↓							
	エスワンタイホウ	80 mg/m ²	内服 (朝夕食後 分2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓
	シスプラチン	60 mg/m ²	2時間	↓																					↓							
Herceptin/ SOX	ハーセプチン	8 mg/kg	90分間	↓																											・Her2陽性進行・再発胃癌 ・3週毎に施行 ・オキサリプラチンの溶解液は5%糖液 ・末梢投与時はオキサリプラチンにデキサト1.65mg混注 ・S-1投与量 体表面積1.5以上は120mg/日	
		6 mg/kg	2回目:90分 以後30分																						↓							
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	2時間	↓																					↓							
	エスワンタイホウ	80 mg/m ²	内服 (朝夕食後 分2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Herceptin/ CAPOX	ハーセプチン	8 mg/kg	90分間	↓																											・Her2陽性進行・再発胃癌 ・3週毎に施行 ・オキサリプラチンの溶解液は5%糖液 ・末梢投与時はオキサリプラチンにデキサト1.65mg混注	
		6 mg/kg	2回目:90分 以後30分																						↓							
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	2時間	↓																					↓							
	カペシタビン	2000 mg/m ²	内服 (朝夕食後 分2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Herceptin/ mFOLFOX6	ハーセプチン	8 mg/kg	90分間	↓																										・Her2陽性進行・再発胃癌 ・3週毎に施行 ・オキサリプラチン、レホホリナートの溶解液は5%糖液		
		6 mg/kg	2回目:90分 以後30分																						↓							
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	↓																					↓							
	レホホリナート	200 mg/m ²	2時間	↓																					↓							
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速点滴	↓																					↓							
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	↓																					↓							