

## マントル細胞リンパ腫

※患者さんの状況に合わせて、投与量や投与間隔等が変更になることがあります。

レジメン	薬剤名	投与量・投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bendamustine	トレアキシシ	120 mg/m <sup>2</sup> 1hr div	↓	↓																			
R-B (2days)	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup> div	↓																				
	トレアキシシ	90 mg/m <sup>2</sup> 1hr div	↓	↓																			
VR-CAP(R day1)	ベルケイド	1.3mg/m <sup>2</sup> s.c.	↓			↓					↓												
	ドキシソルビシ	50mg/m <sup>2</sup> 急速点滴	↓																				
	エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup> 1hr div	↓																				
	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup> div	↓																				
	プレドニン	100mg/body po or div	↓	↓	↓	↓	↓																

・3週毎に施行  
・血管痛発現予防のため、刺入部を温めながら投与する。

・4週毎に施行（3日間に分けて行うこともある。）  
・リツキシマブは前投与薬（抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤）が必要  
・トレアキシシ投与時、血管痛発現予防のため、刺入部を温めながら投与する。

・3週毎に施行  
（リツキシマブはday2に行うこともある）  
・リツキシマブは前投与薬（抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤）が必要