

食道癌

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考			
5-FU/CDDP	フルオロウラシル	800 mg/m ²	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																								・3~4週毎に施行 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要			
	シスプラチン	80 mg/m ²	2時間	↓																															
Pembrolizumab/ 5-FU/CDDP	キイトルーダ [®]	200 mg/body	30分間	↓																													・3週毎に施行 最大6コース 終了後はPembrolizumab単独療法を継続 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要 ・フィルター付き点滴セットを使用する		
	5-FU	800 mg/m ²	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																											
	シスプラチン	80 mg/m ²	2時間	↓																															
DCF (DTX60/CDDP60)	ドセタキセル	60 mg/m ²	1時間	↓																															
	シスプラチン	60 mg/m ²	2時間	↓																														・3週毎に施行 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要	
	フルオロウラシル	750 mg/m ²	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																											
Nivolumab	オプジーボ [®]	240 mg/body	30分間	↓																														・2週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する	
4weekly Nivolumab	オプジーボ [®]	480 mg/body	30分間	↓																														・4週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する	
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	↓																															
	レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	↓																															
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速点滴	↓																															
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	↓																															
Nivolumab/ Ipilimumab	オプジーボ [®]	360 mg/body	30分間	↓																															
	ヤーホイ	1 mg/kg	30分間	↓																															・Nivolumabは3週毎、Ipilimumabは6週毎 ・フィルター付きの点滴セットを使用する