

## 小細胞肺癌

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考				
CPT-11/ CDDP	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	90分間	↓							↓							↓															・小細胞肺癌 ・4週毎に施行 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要			
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	2時間	↓																																
VP-16/ CDDP	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	2時間	↓	↓	↓																													・小細胞肺癌 ・3週毎に施行、ただし、放射線療法併用時は4週毎に施行 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要	
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	2時間	↓																																
VP-16/ CBDCA	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	2時間	↓	↓	↓																													・小細胞肺癌（PS不良もしくは高齢者） ・3週毎に施行、ただし、放射線療法併用時は4週毎に施行	
	カルボプラチン	AUC:5	1時間	↓																																
Atezolizumab/ VP-16/ CBDCA	テセントリク	1200 mg/body	初回:60分 以後 30分	↓																					↓											・小細胞肺癌(進展型) ・3週毎に4コース施行後、維持療法(Atezolizumab単剤療法)へ ・テセントリクはフィルター付き点滴セットを使用する。ただし、エトポシド投与時はフィルターを通さない。
	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	2時間	↓	↓	↓																			↓	↓	↓									
	カルボプラチン	AUC:5	1時間	↓																					↓											
Atezolizumab (維持療法)	テセントリク	1200 mg/body	30分間	↓																					↓											・小細胞肺癌(進展型) 維持療法 ・3週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する
Durvalumab/ VP-16/ CBDCA	イミフィンジ	1500 mg/body	1時間	↓																					↓											・小細胞肺癌(進展型) ・Durvalumabは30kg以下では20mg/kg ・3週毎に4コース施行後、維持療法Durvalumab単剤療法)へ ・フィルター付き点滴セットを使用する。ただし、エトポシド投与時はフィルターを通さない。
	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	2時間	↓	↓	↓																			↓	↓	↓									
	カルボプラチン	AUC:5	1時間	↓																					↓											
Durvalumab (維持療法)	イミフィンジ	1500 mg/body	1時間	↓																																・小細胞肺癌(進展型) 維持療法 ・30kg以下では20mg/kg ・4週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する
Topotecan	ハイカムチン	1 mg/m <sup>2</sup>	30分間	↓	↓	↓	↓	↓																	↓	↓	↓	↓	↓						・小細胞肺癌 2次治療以降 ・3週毎に施行	
AMR	カルセト	30-40 mg/m <sup>2</sup>	急速点滴	↓	↓	↓																			↓	↓	↓									・非小細胞肺癌、小細胞肺癌(2次治療以降) ・3~4週毎に施行