膵・胆道癌

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考
GEM/S-1	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	1000 mg/㎡	30分間	↓							↓														↓							・3週毎に施行 ・ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝの溶解液は5%糖液（血管痛軽減のため） ・S-1投与量：体表面積1.5以上は120mg/日
	ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ	80 mg/㎡	内服 （朝夕食後 分2）	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
GEM/CDDP	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	1000 mg/㎡	30分間	↓							↓														↓							・胆道癌 ・3週毎に施行 ・ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝの溶解液は5%糖液（血管痛軽減のため） ・CDDP→GEMの順で投与
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	25 mg/㎡	2時間	↓							↓														↓							
FOLFIRINOX	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	150 mg/㎡	90分間	↓														↓														・膵癌 ・2週毎に施行 ・ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ、ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄは同時投与、溶解液は5%糖液
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	85 mg/㎡	2時間	↓														↓														
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	200 mg/㎡	2時間	↓														↓														
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	400 mg/㎡	急速点滴	↓														↓														
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	2400 mg/㎡	46時間	↓														↓														
Abraxane/GEM	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	125 mg/㎡	30分間	↓							↓							↓														・膵癌 ・4週毎に施行 ・前投与薬(ﾈｵﾚｽﾀｰﾙ、ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ)は不要 ・特定生物由来製品；患者への説明(同意書)が必要 ・通常の点滴ｾｯﾄを使用できる
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	1000 mg/㎡	30分間	↓							↓							↓														