

膵・胆道癌

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM/S-1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30分間	↓							↓														↓						
	エスワンタイホウ	80 mg/m ²	内服 (朝夕食後 分2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓									↓	↓	↓	↓	↓	↓
GEM/CDDP	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30分間	↓							↓														↓						
	シスプラチン	25 mg/m ²	2時間	↓							↓														↓						
FOLFIRINOX	イリノテカン	150 mg/m ²	90分間	↓														↓													
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	↓														↓													
	レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	↓														↓													
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速点滴	↓														↓													
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	↓														↓													
Abraxane/ GEM	アブラキサソ	125 mg/m ²	30分間	↓							↓							↓													
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30分間	↓							↓							↓													
NaI-IRI+ 5-FU/LV	オニバド	70 mg/m ²	90分間	↓														↓													
	レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	↓														↓													
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	↓														↓													

備考

- ・3週毎に施行
- ・ゲムシタビンの溶解液は5%糖液(血管痛軽減のため)
- ・S-1投与量:体表面積1.5以上は120mg/日

- ・胆道癌
- ・3週毎に施行
- ・ゲムシタビンの溶解液は5%糖液(血管痛軽減のため)
- ・CDDP→GEMの順で投与

- ・膵癌
- ・2週毎に施行
- ・オキサリプラチン、レボホリナートは同時投与、溶解液は5%糖液

- ・膵癌
- ・4週毎に施行
- ・前投与薬(ネオレスタール、ファミチジン)は不要
- ・特定生物由来製品:患者への説明(同意書)が必要
- ・通常の点滴セットを使用できる

- ・膵癌
- ・2週毎に施行