

頭頸部癌

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考	
Tri-weekly CDDP(100)/radiation	シスプラチン	100 mg/m ²	2時間	↓																					↓							・化学放射線療法 ・3週毎に施行 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要	
TPF	ドセタキセル	60 mg/m ²	1時間	↓																												・3週毎に施行 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要	
	シスプラチン	60 mg/m ²	2時間	↓																													
	フルオウラシル	600 mg/m ²	24時間	↓	↓	↓	↓																										
Pembrolizumab	キイトルーダ	200 mg/body	30分間	↓																					↓							・3週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する	
Pembrolizumab/ 5-FU/CDDP	キイトルーダ	200 mg/body	30分間	↓																												・3週毎に施行 最大6コース 終了後はPembrolizumab単独療法を継続 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要 ・フィルター付き点滴セットを使用する	
	フルオウラシル	1000 mg/m ²	24時間	↓	↓	↓	↓																										
	シスプラチン	100 mg/m ²	2時間	↓																													
Pembrolizumab/ 5-FU/CBDCA	キイトルーダ	200 mg/body	30分間	↓																												・3週毎に施行 最大6コース 終了後はPembrolizumab単独療法を継続 ・フィルター付き点滴セットを使用する	
	フルオウラシル	1000 mg/m ²	24時間	↓	↓	↓	↓																										
	カプホプラチン	AUC:5	1時間	↓																													
Nivolumab	オプジーホ	240 mg/body	30分間	↓																												・2週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する	

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考	
Erbitux	アービタックス	400 mg/m ²	2時間	↓																													・毎週施行 ・前投与薬(ネオレスタール、デキサート)が必要
		250 mg/m ²	1時間								↓							↓							↓								
Erbitux + weeklyPTX (毎週)	アービタックス	400 mg/m ²	2時間	↓																													・4週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する ・前投与薬(デキサート、ネオレスタール、ファモチジン)が必要
		250 mg/m ²	1時間								↓							↓							↓								
	パクリタキセル	80 mg/m ²	1時間	↓							↓							↓															
CAP	エンドキサン	500 mg/m ²	30分間	↓																												・4週毎に施行 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要	
	ドキシソルビシン	50 mg/m ²	急速点滴	↓																													
	シスプラチン	50 mg/m ²	2時間	↓																													